क्लो रऐन्ट्रानि लि प्रोल 0.4% भार/भार जी आर
(की टनाशक)

क्लो रऐन्ट्रानि लि प्रोल 0.4% भार/भार जी आर एक नवीन ग्रैन्यू ल की ट नाशी है जि समें 0.4% क्लो रऐन्ट्रानि लि प्रोल सक्रिय तत्व के रूप में मि श्रित है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (मि. ली.)	पानी की मात्रा (लीटर/हैक्टेयर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
धान	पीत तना छेदक (स्किं पोफागा इन्सें टुलस) धान का पत्ता मोड़क (नैफाला क्रोसिस मेडि नेलि स)	*40*	*10*	बि खराव	*53*	
गन्ना	तना/कॉपल छेदक (काइलो इनफुस्कैटेलस) शीर्ष छेदक (स्किं पोफागा एक्स रप्ट लि स)	*75*	*18.5*	बि खराव	*147*	

उपयोग के लि ए दि शा-नि र्देश :
क्लो रऐन्ट्रानि लि प्रोल ग्रैन्यू ल्स 4 कि .ग्रा. प्रति एकड़ धान के खेत में और 7.5 कि .ग्रा. प्रति एकड़ गन्ने के खेत में एक साथ बि खरे। गन्ने में फरटेरा का प्रयोग बुआई के समय नाली में तथा अंकुरण के समय कल्लों की जड़ो के पास मि ट्टी में पंक्ति में डाले और इसके बाद सिं चाई कर दें।

प्रयोग का समय
1. धान की रोपाई के 15-35 दि न बाद बि खराव करें। 2. गन्ने के खेत में बुआई से पहली सिं चाई तक प्रयोग करने पर तना छेदक से बचाव होता है। शीर्ष छेदक से बचने के लि ए शीर्ष छेदक की टों के अण्ड ज दि खते ही प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ता ओं के लि ए सावधानि यां
1. खाधसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें।
2. मं ुह, त्व चा, आंखों और साँस द्वारा अन्द र जाने से बचायें
3. प्रयोग करने के बाद दूषि त कपडों और शरी र के अंगो को अच्छी तरह धोएं।
4. प्रयोग करते समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहि ए।
5. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्म क कपडे जैसे रबड़ के दस्ता ने, चश्मे और आँख/चहरे का नकाब पहनें।

वि ष के लक्षण
आलस आना, धं ुधला दि खना तथा नाक बहना।

प्राथमि क चि कि त्सा
1. त्व चा संपर्क पर: त्व चा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 2. आँख से संपर्क होने पर: आंखो को खूब सारे पानी से प्रक्षालन करने की सलाह दी जाती है। यदि जरूरी लगे तो चि कि त्स क से संपर्क करें। 3. सांस में जाने पर: कोई वि शि ष्ट उपचार नही बताया गया है। 4. नि गलने पर चि कि त्स क से संपर्क करें।

पौधवि शाक्त ता
सि फारि श स्त र में छि ड़कने पर पौध वि षाक्तता नहीं होती।

वि ष नाशक
कोई वि शि ष्ट वि षनाशक नही है, लक्षण के अनुसार इलाज करें।

खाली डि ब्बों का नि पटारा
1.खाली डि ब्बों को तोड कर जमीन में 1/2 मीटर गहराई में नि वार स्था न से दूर मि ट्टी में गाड दें।
2. खाली डि ब्बों को दुबारा काम में लेना रोकने के लि ए बाहर न छोडें।
3. की टनाशक नि र्मा ताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि पैकेज, मशीन की धुलाई बची हुई साम्रगी आदि की नि कासी की व्य वस्था ऐसी सुरक्षित से करना चाहि ए, ताकि इनसे पानी, वातावरण व चारे दूषि त न हो, खाली डि ब्बों और पैकेज को तोडकर अबादी से दूर गाढ देना चाहि ए।

संग्रहण की शर्ते
1. की टनाशक के पैकटो को अलग-अलग कमरों या जगहों में अन्य वस्तु एं खाध पदार्थो भं डारण कि ये जाने वाले कमरों या जगहो से दूर की टनाशक के प्रकार व परि णाम के अनुसार ताला चाबी में बंद करके रखा जाना चाहि ए।
2. जहाँ भोजन, पेयजल, तंबाकू आदि संदूषि त हो जाए, वैसी जगह पर इस साम्रगी को स्टो र न करे और न ही वहां खाये पीयें। 3.जि स कमरे अथवा जगह में की टनाशक का भं डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाश युक्त, हवादार व आयतन में पर्या प्त लम्बा चौडा होना चाहि ऐ।

रासायनि क संरचना

1 क्लो रऐन्ट्रानि लि प्रोल	0.40 % भार/भार
2 पोलि एक्रिलि क ऐसि ड	0.40 % भार/भार
3 पानी	0.40 % भार/भार
4 डोडि सि ल हाइड्क्सी पोलि (ओक्सी -1,2-इथेनडाइल) फास्फे ट	0.40 % भार/भार
5 कैलशि यम इग्नो सल्फो नेट	1.00 % भार/भार
6 डाइ ब्लू	0.05 % भार/भार
7 टाल्क पाउडर	8.00 % भार/भार
8 बालू पर्या प्त मात्रा	% भार/भार
कुल	100 %

ಕ್ಲೋ ರಾಂಟ್ರಾನಿ ಲಿ ಪ್ರೋಲ್ 0.4% ಭಾರ್/ಭಾರ್ ಜಿ ಆರ್
(ಕಿ ಟನಾಶಕ್)

ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 0.4% w/w GR ಒಂದು ನವೀನ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 0.4% ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ.

ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರಗೆ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾಂ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಫಸಲು ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಅಕ್ಕಿ	ಹಳದಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ (ಸ್ಕಿರೋಫಗ್ನೈಸರ್ಟುಲಾಸ್) ಭತ್ತದ ಎಲೆಯ ಹೊಲ್ಲರ್ (ಕ್ನಾಫಲೋಕ್ರೊಸಿಸ್ ಮೆಡಿನಾಲಿಸ್)	*40*	*10*	ಪ್ರಸಾರ	*53*
ಕಬ್ಬು	ಎರ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಬೋರರ್ (ಚಿಲೋಮಿನ್-ಫಸ್ಕಾಟೆಲಸ್) ಟಾಪ್ ಬೋರರ್ (ಸಿಫೋಫಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾಲಿಸ್)	*75*	*18.5*	ಪ್ರಸಾರ	*147*

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ
ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 4 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ 7.5 ಕೆ.ಜಿ. ಕಬ್ಬಿಗೆ, ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಊಂಗ್ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಚಿಗುರುಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ತೋಡುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರಾವರಿ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ : 1. ಅಕ್ಕಿಗೆ 15-35 DAT (ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ದಿನಗಳು). 2. ಕಬ್ಬಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಡುವಿಕೆಯಿಂದ 1 ನೇ ನೀರಾವರಿ ನಡುವೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆರಂಭಿಕ ಶೂಟ್ ಬೋರರ್‌ಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಟಾಪ್ ಬೋರರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಟಾಪ್ ಬೋರರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು

ಪತಂಗಗಳು.

ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1.ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಕನ್ನಡಕಗಳು ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣು/ಮುಖದ ಗುರಾಣಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಆಲಸ್ಯ, ಮೂಗಿನ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 2. ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 3. ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 4. ನುಂಗಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ

ಶಿಫಾರಸು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ

ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ

1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ½ ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.
2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು.
3. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು

ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ. :

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣವನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ. 2. ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಈ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. 3. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಆವರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ತಂಪಾದ ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮದ.

1 ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಎ.ಐ.	0.40 % w/w
2 ಪಾಲಿಯಾಕ್ರಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ	0.40 % w/w
3 ನೀರು	0.40 % w/w
4 ಡೋಡೆಸಿಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪೋಲಿ (ಆಕ್ಸಿ-1,2-ಎಥನೆಡಿಲ್) ಫಾಸ್ಫೇಟ್	0.40 % w/w
5 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	1.00 % w/w
6 ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ	0.05 % w/w
7 ಟಾಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್	8.00 % w/w
8 ಮರಳು	Q.S % w/w
ಒಟ್ಟು	100 % w/w

குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 0.4% w/w GR
(பூச்சிக்கொல்லி)

குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 0.4% w/w GR என்பது ஒரு புதிய சிறுமணி பூச்சிக்கொல்லியாகும், இதில் 0.4% குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் செயலில் உள்ள மூலப்பொருள் உள்ளது.

பயிர்(கள்)	பூச்சிகளின் பொதுப் பெயர்கள	அளவு / ஹெக்டர் A.I. (கிராம்)	அளவு / ஹெக்டர் ஃபார்மு லேஷன் (கிராம்)	தண்ணீரில் செறிவு குறைத்தல் (லி)	கடைசி ஸ்ப்ரேயிலிருந்து அறுவடை வரைக்குமான காத்திருப்பு காலம் (நாட்களில்
Rice	Yellow Stem Borer (Scirpophagaincertulas) Paddy leaf Folder (Cnaphalocrosis medinalis)	40	10	Broadcast	53
Sugarcane	Early Shoot Borer (Chiloin-fuscatellus) Top Borer (Scirphophaga excerptalis)	75	18.75	Broadcast	147

பயன்பாட்டின் திசை
ஒரு ஏக்கருக்கு அரிசியில் 4 கிலோவும், கரும்பில் 7.5 கிலோவும் குளோராரன்ட்ராளிலிப்ரோல் துகள்களை ஒரே சீராக ஒளிபரப்பவும். கரும்புக்கு, நடவு செய்யும் போது உரோமங்களிலோ அல்லது வளர்ந்து வரும் தளிர்களின் அடிப்பகுதியிலோ பயிரிட வேண்டும்.

நீர்ப்பாசனம்.

வீண்ணப்ப நேரம்
1. அரிசிக்கு 15-35 DAT (நாற்று நடவு செய்த நாட்கள்). 2. கரும்பாக இருந்தால், நடவு முதல் 1வது நீர்ப்பாசனம் வரை பயன்படுத்த வேண்டும்
மேல் துளைப்பான் பயன்பாட்டிற்கு மேல் துளைப்பான் தோற்றத்துடன் ஒத்துப்போக வேண்டும்.

அந்துப்பூச்சிகள்.

தற்காப்பு நடவடிக்கைகள்
1.உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப் பொருள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உணவளிக்காமல் இருத்தல்.
2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதையும் பூச்சிக்கொல்லியை உள்ளிழுப்பதையும் தவிர்க்கவும்.
3. கையாளப்பட்ட பிறகு அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடல் பாகங்களை நன்கு கழுவவும்.
4. ரப்பர் கையுறைகள், கண்ணாடிகள் போன்ற முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள். கையாளும் போது கண்/முக கவசம்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்
சோம்பல், நாசி சுரப்பு மற்றும் மங்கலான பார்வை.

முதலுதவி
1. தோலில் இருந்தால், அசுத்தமான தோலை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும்.
2. கண்களில் இருந்தால், நிறைய தண்ணீர் கொண்டு கழுவுவது நல்லது. தேவைப்பட்டால் மருத்துவரை அணுகவும். 3. உள்ளிழுத்தால், குறிப்பிட்ட தலையீடு எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை.
4. விழுங்கினால். மருத்துவரை அணுகவும்.

பைட்டோடாக்சிசிட்டி
பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிலைகளில் பைட்டோடாக்ஸிக் இல்லை.

மாற்று மருந்து
குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் இல்லை, அறிகுறி சிகிச்சை.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அகற்றுதல்
1. பொட்டலங்கள் உடைக்கப்பட்டு, வசிப்பிடத்திலிருந்து ½ மீட்டர் ஆழத்தில் மண்ணில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.
2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க அவற்றை வெளியே விடக்கூடாது.
3. சுற்றுச்சூழலைத் தடுக்கும் வகையில், உபரிப் பொருள்கள் மற்றும் போர்த்தி மூலம் தொகுப்புகள் பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

நீர் மாசுபாடு.

களஞ்சிய நிலைமை
1. பூச்சிக்கொல்லி உள்ள பொட்டலங்கள் அசல் கொள்கலன்களில் தனித்தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்பட வேண்டும்.
மற்ற பொருட்களை சேமிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அறை அல்லது வளாகம் அல்லது பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் தனித்தனி அலமாரிகளில் வைக்கப்படும்
பூச்சிக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மையின் அடிப்படையில்.
2. உணவு, பானம் அல்லது புகையிலை இந்த பொருளால் மாசுபட்ட பகுதிகளில் சேமிக்கவோ அல்லது உட்கொள்ளவோ கூடாது.
3. பூச்சிக்கொல்லிகளை சேமிப்பதற்கான அறை மற்றும் வளாகம் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், குளிர்ந்த உலர்ந்த இடமாகவும், நன்கு வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டமாகவும் இருக்க வேண்டும்.
போதுமான அளவு.

இரசாயன கலவை

1 குளோராரன்ட்ரானிலிப்ரோல் ஏ.ஐ.	0.40 % w/w
2 பாலிஅக்ரிலிக் அமிலம்	0.40 % w/w
3 நீர்	0.40 % w/w
4 டோடெசில் ஹைட்ராக்ஸிபோலி (ஆக்ஸி-1,2-எத்தனெடில்) பாஸ்பேட்	0.40 % w/w
5 கால்சியம் லிக்னோசல்போனேட்	1.00 % w/w
6 சாயம் நீலம்	0.05 % w/w
7 டால்க் பவுடர்	8.00 % w/w
8 மணல்	Q.S % w/w
மொத்தம்	100 % w/w

CHLORANTRANILIPROLE 0.4% w/w GR
(Insecticide)

Chlorantraniliprole 0.4% w/w GR is a novel granular insecticide which contains 0.4% Chlorantraniliprole active ingredient.

Recommendation

Crop	Common Name of Pest (gm)	Dosage per Hectare a.i. (gram)	Dosage per Hectare Formulation (gram)	Dilution in water /ha(litre)	Waiting period Between last spray & harvest (days)	Re-entry after each Application/in hours
Rice	Yellow Stem Borer (Scirpophagaincertulas) Paddy leaf Folder (Cnaphalocrosis medinalis)	40	10	Broadcast	53	
Sugarcane	Early Shoot Borer (Chiloin-fuscatellus) Top Borer (Scirphophaga excerptalis)	75	18.75	Broadcast	147	

Direction Of Use :
Uniformly broadcast Chlorantraniliprole granules @ 4 kg/ acre in Rice and 7.5 kg/ acre in Sugarcane. For Sugarcane, application is to done in furrows at planting or at the base of uoung emerging shoots along the furrows followed by an irrigation.

Time of Application :
1. 15-35 DAT (Days after transplanting) for Rice. 2. In case of sugarcane, application between planting to 1st irrigation is recommended for Early Shoot Borer while for Top borer application should conincide with appearance of Top borer moths.

Precautions :
1.keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin and inhallation of the insecticide.
3.Wash thoroughly the contaminated clothes and body parts after handling.
4. Wear full protective clothing viz., rubber gloves, goggles. eye/face shield while handling.

Symptoms Of Poisoning
Lethargy, nasal secretion and blurred vision.

First Aid
1. If on skin, wash the contaminated skin with soap and water.
2. If on eyes, flushing with plenty of water is plenty of water is advisable. Consult a physician if necessary.
3. If inhaled, no specific intervention is indicated.
4. If swallowed, Consult a physician.

Phytotoxicity
No phytotoxic at recommended stages.

Antidote
No specific antidote is available, treat symtopmatically.

Disposal Of Used Container
1. The packages shall be broken and buried ½meter deep in soil away from habitation.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages by surplus material and wrapping shall be disposed off in a safe manner so as to prevent enviromental and water pollution.

Storage Conditions
1. The packages containing the insecticide shall be stored in original containers in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articals or shall be kept in separate almarihs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. Don't store or consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material. 3. The room and premises meant for storing the insecticides shall be well built, cool dry place, well-lit and ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition

1 Chlorantraniliprole a.i.		0.40 % w/w
2 Polyacrylic acid		0.40 % w/w
3 Water		0.40 % w/w
4 Dodecyl hydroxypoly	(oxy-1,2-ethanediyl)phosphate	0.40 % w/w
5 Calcium lignosulphonate		1.00 % w/w
6 Dye blue		0.05 % w/w
7 Talc powder		8.00 % w/w
8 Sand		Q.S % w/w
Total		100 % w/w

క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 0.4% భా/భా జిఆర్
(కీటనాశిని)

క్లోరింట్రానిలిప్రోల్ 0.4% భా/భా జిఆర్ (సిసేల్) అనేది గుళికల రూపంలో గల సరికొత్త కీటకనాశిని. ఇందు 0.4% లలో క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ అనే సక్రియ పదార్థము కలదు.

సిఫారసులు :

పంటలు	కీటకాల సాధారణ నామము	మోతాదు/హె. స.వ. (గ్రా.)	మోతాదు/హె. సూత్రీకరణ (మి.లీ)	నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారి నుండి పునఃప్రవేశం వరకు కోత మధ్య విరామ సమయం (రోజులు)	ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
వరి	పసుపుపచ్చ కాండము తొలుచు పురుగు లేదా మొవ్వుచచ్చు	40	10	ఎదజల్లడం	53	
చెరకు	పీక పురుగు (చిలో జన ఫ్యూస్ కేబిల్లస్) దవ్వతొలుచు, మొవ్వుచచ్చు పురుగులు లేదా దవ్వచచ్చు పురుగులు (స్కిరోఫోగ ఎక్స్‌సెర్ప్ టాలిస్)	75	18.75	ఎదజల్లడం	147	

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : వరిపంటకయితే ఎకరాకు 4 కేజీల చొప్పున, చెరకు పంటకయితే ఎకరాకు 7.5 కేజీల చొప్పున ఏకరితిలో క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ జల్లు కోవాలి. సిసేల్ పంటకోసం ఫెర్టిలైజరు బోదెలలో నాటేటప్పుడు లేదా మొలకలు వేసేటప్పుడు వాటి మొదట్లో బోదెలపద్ద వాడి నీరు పెట్టుకోవాలి.

ఉపయోగించు సమయం : 1. వరి పంటకయితే నాటిన 15-35 రోజుల తర్వాత. 2. చెరకు పంటలో పీక పురుగు అరికట్టుటకై నాటిన పిదప మరియు మొదటిసారి ఇరిగేషన్ చేయు సమయానికి మధ్యలో వాడాలి. అలాగే దవ్వతొలుచు, మొవ్వుచచ్చు పురుగులు లేద దవ్వచచ్చు పురుగులకయితే, తల్లి పురుగు (మాత్) కనికనబడిన వెంటనే జల్లుకోవాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలకి, ఖాళీ పంట పాత్రలకి మరియు పశువుల దాణాకు దూరంగా ఉంచాలి. 2. నోటికి, కంటికి చర్మమునకు తగులకుండా మరియు లోనికి పీల్చకుండా జాగ్రత్తపడవలెను.3. కలుషిత దుస్తులని మరియు శరీర భాగాలను ఉపయోగం తర్వాత శుభ్రపర్చుకోవలెను, మరియు శుభ్రంగా స్నానం చేయాలి. 4. పిచికారీ చేస్తున్నపుడు పొగత్రాగరాదు, త్రాగరాదు, తినరాదు మరియు ఏదైనా నమలుట వంటివి చేయరాదు. 5. ఉపయోగించునప్పుడు పూర్తి రక్షణనిచ్చే దుస్తులైన రబ్బరు చేతి తొడుగులు, కళ్ళజోడు, ముఖకవచము వంటివి ధరించాలి.

విషలక్షణాలు : మందకొడితనం, ముక్కువెంబడి నీరుకారటం, పడిశం మరియు కళ్ళ మూసుకుపోవడం వంటివి సంభవిస్తాయి.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మింగినచో, గొంతు వెనుకభాగం ప్రేరేపించి మందు ద్రావణము పూర్తిగా బయటకు వచ్చే వరకు మరల మరల వాంతి చేయించండి. అపస్మారక స్థితిలోని రోగిని వాంతికి ప్రేరేపించకండి. 2. దుస్తులు మరియు చర్మము కలుషితమైనచో దుస్తులు తొలగించి, కలుషిత చర్మమును సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో బాగా శుభ్రపరుచుకొనండి. 3. కళ్ళలో పడినచో, 10-15 నిమిషముల వరకు సెలైన్/శుభ్రమైన నీటితో ధారగా కడగండి. 4. పీల్చినచో రోగిని తాజా గాలిలోని తరలించండి.

విషతుల్యత: సిఫారసు మోతాదులో ఉపయోగించినచో హానికరం కాదు.

విరుగుడు : ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమి లేదు. విష లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ విసర్జన : 1. తయారీదార్లు, ఫార్ములేటర్లు మరియు అపరేటర్లు ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవాలను పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా విసర్జించాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించడానికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు : 1.ఈ కీటకనాశిని గల ప్యాకేజీలను ఒరిజినల్ డబ్బాలలోనే వుంచి ఇతర పదార్థములు నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణలలో గాకుండా వేరుగా వాటి నైజము మరియు పరిమాణాన్ని బట్టి వేరు వేరు అలమారాలలో మెట్టి తాళం వేసి మాత్రమే నిల్వ చేయాలి. 2. వీటిని నిల్వచేసే గదులలో వేరే పదార్థాలు నిల్వచేయడం, అప్పుడు ఏదైనా తినడం త్రాగడం లేదా పొగపీల్చడం లాంటి పనులు చేయరాదు. ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతం ఈ కీటకనాశినితో కలుషితమై వుంటుంది గనుక. 3. దీన్ని నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణలు గట్టి కట్టడములై, చల్లగా పొడిగా వుండాలి. అంతేగాక మంచిగాలీ, వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో, కలుషిత అవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం:

క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ స.ప.	0.40% భా/భా
పాలిఆక్రిలిక్ ఆమ్లం	0.40% భా/భా
నీరు	0.40% భా/భా
డోడిసిల్ హైడ్రాక్సిపాలి (ఆక్సి-1,2-ఇథానిడైల్) ఫాస్ఫేట్	0.40% భా/భా
కాల్షియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	1.00% భా/భా
డై బ్లూ	0.05% భా/భా
టాల్క్ పౌడర్	8.00% భా/భా
ఇసుక	క్యుయస్% భా/భా
మొత్తం	100%భా/భా

ERAGOLD

CHLORANTRANILIPROLE 0.4% w/w GR (Insecticide)

క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 0.4% భా/భా జిఆర్ (కీటనాశిని)

क्लो रऐन्ट्रानि लि प्रोल 0.4% भार/भार जी आर
(की टनाशक)

क्लो रान्ट्रानि लि प्रोल 0.4% भार्/भार् जि आर्
(कि टनाशक्)

குளோராண்ட்ரானிலிப்ரோல் 0.4% w/w GR
(பூச்சிக்கொல்லி)

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

जहर
ವಿಷಂ
ఎిష విషము
POISON

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।
ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ
பயன்பாட்டிற்கு முன் முழு லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரத்தையும் படிக்கவும்

Manufactured & Marketed by :
Maa Agri Sciences Private Limited
Survey No. 734, Mandollagudem Village, Chinnakondur,
Choutuppal Mandal, Bhuvanagiri Dist. - 508252, T.S. India
Customer Care No. : 08694293575, E-mail : maaagri2020@gmail.com

Regd. No. : CIR- 326430/2023-Chlorantraniliprole (Gr) (447)-795
Mfg. Lic No. 117/TS-IML/2023