Cyantraniliprole 10.26% w/w OD
(Systemic and Contact Insecticide)

Cyantraniliprole 10.26% w/w OD is a novel anthranilic diamide insecticide effective against a cross spectrum of chewing and sucking pests. It is a systemic insecticide which is effective through ingestion and contact Warning: This product is toxic to aquatic organisms and honeybees thus may be avoided near aquaculture and active period of foraging of honey bees.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in Water (litre)	Waiting Period between each last spray to harvest day	Re-entry after Application (In Hours)
Bitter gourd	Thrips-thrips palmi white flybemisia tabaci aphids-aphis gossypii pumpkin caterpillardiaphania indica leaf minerliriomyza trifolii	90	900	500	5	-
Brinjal	Whiteffly-bemisia tabaci shoot and fruit borer-leucinodes orbonalis aphids-aphis gossypii thrips-thrips tabaci	90	900	500	3	-
Cabbage	Cabbage Aphid – BrevicoryneBrassaicae Mustard Aphid – Lipaphis erysimi Diamond back moth – Plutella xylostella Tobacco carepillar – Spodoptera litura	60	600	500	5	-
Chilli	Thrips- Scirtothrips dorsalis Fruit borer- Helicovepra armigera Tobacco caterpillar- Spodoptera litura	60	600	500	3	
Cotton	Whiteffly-bemisia tabaci aphidsaphis gossypii thrips-thrips-thrips tabaci tobacco caterpillarspodoptera litura bollwormshelicoverpa armigera & earias vitella	90	900	500	7	-
Gherkins	Leaf miner – Liriomyza trifolii Red pumpkin beetle – Aulacophora foveicolis Aphids – aphis gossypii Thrips – Thrips palmi While fly – Bemesia tabaci Pumpkin caterpillar – Diaphania indica Fruit fly – Bactrocera cucurbitae	90	900	500	5	
Grapes	Thrips-scirtothrips dorsalis Flea beetle- Sceloconta strigicollis	70	700	1000	5	
Okra	Whitefly-bemisia tabaci aphid aphis gossy pii shoot & fruit borer – earias vitella tobacco caterpillarspodoptera litura fruit borer – helicoverpa armigera	90	900	500	3	-
Pome granate	Thrips-scirtothrips dorsalis Pomegranate butterfly – Deudorix Isocrates	75(0.0075%)	750(0.075%)	1000	5	
	Whiteffly-Siphoninus phillyreae Aphids-Aphis punicae	90(0.009%)	900(0.09%)	1000	5	
Ridge gourd	Thrips-thrips palmi white fly – bemisia tabaci aphids-aphis gossypii pumpkin caterpillardiaphania indica leaf minerliriomyza trifolii	90	900	500	5	-
	Thrips-thrips palmi white fly – bemisia tabaci aphids-aphis gossypii pumpkin caterpillardiaphania indica leaf minerliriomyza trifolii	90	900	500	5	-
Tomato	Leaf miner- Liriomyza trifolii Aphids – Aphis gossypii Thrips – Thrips tabaci While fly – Bemesia tabaci Fruit borer- Helicovepra armigera	90	900	500	5	-
Wate rmelon	Thrips-thrips palmi white flybemisia tabaci aphids-aphis gossypii leaf miner- liriomyza trifolii	90	900	500	5	-

Direction Of Use : -

Time of Application :

Precautions : 1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes, and skin and inhalation of the insecticide spray mist. 3. Use protective clothing which included long sleeved shirt and long pants chemical resistant gloves shoes + stocks. 4. Use protective eye wear as the product is a moderate eye irritant. 5. Wash thoroughly the contaminated clothes and body parts after handling. 6. Do not eat, drink or smoke while applying.

Symptoms Of Poisoning : May cause moderate eye irritation. Prolonged or frequently repeated akin contact may cause allergic reactions in some individuals

First Aid : 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing with difficulty give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. C-consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the effected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails if pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists Consult eye specialist

Phytotoxicity : .

Antidote : No specific antidote is known, treat symptomatically

Disposal Of Used Container : 1. Empty containers should not be re-used. These should be triple rinsed with water and rinsate should be poured to the spray mix. 2. The packages shall be broken and buried away from habitation. 3. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 4. Packages or surplus material and washing shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate room or premises used for storing other articles, away from the reach of children and livestock. Animal feed or shall be kept in a separate almirah under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well-lit, ventilated and of sufficient dimensions so as to avoid contamination with vapors.

Chemical Composition :

Cyantraniliprole a.i.	10.26 % w/w
Dodecyl benzene sulphonate in methylated and ethoxylated seed oil	25.00 % w/w
Polyoxyethylene sorbitol fatty acid	5.00 % w/w
Fumed silica	1.31 % w/w
Citric acid	0.02 % w/w
Water	4.11 % w/w
Methylated seed oil %	Q.S
Total :	100 % w/w

सायनट्रैनीलिप्रोल १०.२६% भा/भा ओ.डी.
(अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

सायनट्रैनीलिप्रोल १०.२६% भा/भा ओ.डी. एक अनूठा एंथ्रानिलिक डायमाइड कीटनाशक है जो विभिन्न वर्गो के चबाने व चूसने वाले कीटो पर आधारित है । यह एक अन्दरप्रवाही कीटनाशक है जो कीटो द्वारा खाए जाने या संपर्क में आने पर अत्यंत असरदार है । चेतावनी : यह उत्पानद जलीय जीवो और मधुमक्खियों के लिए विषैला है, इसलिए इसका इस्तेरमाल मत्स्य पालन के पास, मधुमाक्खियों के सक्रिय अवधि वाली गतिविधियों मे नही करना चाहिए ।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	प्रति हेक्टेयर मात्रा संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा / (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद
करेला	चुरमे-थ्रिपसस पालमी सफेद मक्खीत-बेमिसिया टाबासी बेप-एफिस गॉसिपी भोपला की इल्ली -डायफानिया इंडिका चुरंगी कीट- लिरियोमायजा ट्राइफोलि	९०	९००	५००	५	-
बैंगन	सफेद मक्खी -बेमिसिया टाबासी कली एवं फल छेदक -लेयूसीनोडस ओर्बोनालिस बेप-एफिस गॉसिपी चुरमे- थ्रिपसस टाबासी	९०	९००	५००	३	-
पत्तागोभी	पत्तागोभी बेप- ब्रेसिकॉरिन ब्रेसीकाय सरसो बेप - लिपाफिस एरिसिमी गोभी की भगमीले फुगबे - प्लुटेला आलोस्टेला तंबाकू की इल्ली - स्पोडोप्टेरा लिटूरा	६०	६००	५००	५	
मिर्ची	चुरमे-स्किरटोथ्रिपस डोर्सालिस फल छेदक - हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा तंबाकू की इल्ली स्पोडोप्टेरा लिटूरा	६०	६००	५००	३	
कपास	सफेद मक्खीट- बेमिसिया टाबासी बेप-एफिस गॉसिपी चुरमे-थ्रिपसस टाबासी तम्बाकू की इल्लीब- स्पो डोप्टेरा लिटूर डिडे मी सूंडी - हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा एव ईएरियास विटेला	९०	९००	५००	७	-
गर्किन (खेरा खीरा)	सुरंगी कीट-लिरिओमाएजा ट्राइफोलि लाल कुम्हड़े के ष्ठीटुर - ऑलाकोफोरा फोयायकॉलिस बेप - एफिस गॉसिपी चुरमे - थ्रिप्स पालमी सफेद मक्खी - बेमेसीया टाबासी भोपाल की इल्ली - डायफानिया इंडिका फल मक्खी - बैक्ट्रोसेरा कुर्कोसीटाई	९०	९००	५००	५	
अंगुर	चुरमे - स्किरटोथ्रिपस डोर्सालिस इल्ली ष्ठीटुर- स्पोडोप्ट लिटुरिमॉलिस	७०	७००	१०००	५	
भिंडी	सफेद मक्खी-बेमिसिया टाबासी कली एवं फल छेदक- ईएरियास विटेला बेप-एफिस गॉसिपी तम्बांकू की इल्लीब- स्पो डोप्टेरा लिटूरा फल छेदक - हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा	९०	९००	५००	३	
अनार	चुरमे-स्किरटोथ्रिपस डोर्सालिस अनार तितली क्यीवीरिक्स आइसोक्रेट्स सफेद मक्खी - सिफोनिनस फिलीप्राय बेप-एफिस पुनिकाय	७५ (०.००७५%) ५०(०.००९%) ९०	७५० (०.०७५%) ९००(०.०९%) ९००	१००० १००० ५००	५ ५ ५	
	चुरमे-थ्रिपसस पालमी सफेद मक्खीत - बेमिसिया टाबासी बेप- एफिस गॉसिपी भोपला की इल्ली -डायफानिया इंडिका चुरंगी कीट-लिरियोमायजा ट्राइफोलि	९०	९००	५००	५	
टमाट	सुरंगी कीट- लिरियोमायजा ट्राइफोलि बेप- एफिस गॉसिपी चुरमे-थ्रिप्स टाबासी सफेद मक्खी - बेमेसीया टाबासी फल छेदक - हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा	५०	५००	५००	३	
तरबूज	चुरमे-थ्रिपसस पालमी सफेद मक्खी - बेमिसिया टाबासी बेप-एफिस गॉसिपी सुरंगी कीट-लिरियोमायजा ट्राइफोलि	९०	९००	५००	५	-

उपयोग के लिये दिशा – निर्देश : —

प्रयोग का समय : ———

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें । २. मुंह, आँखो, त्वचा को सम्पर्क से बचाये । ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये । हवा की दिशा मे छिड़काव करे । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धुम्रपाम, खाना, पीना और कुछ चबानी नही चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने ।

विष के लक्षण : आंखो में थोडी जलन पैदा कर सकता है । त्वचा से देर तक या बार - बार सम्पर्क होने पर कुछ लोगों में एलर्जी की प्रतिक्रियाएं हो सकती है ।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल लिया है: यदि मरीज होश में है और सचेत है तो मूँह को पानी से साथ कुल्ला कराए और पीने के लिए १ या २ गिलास पानी दें । कभी भी किसी बेहोश व्यक्ति को मूँह के द्वारा कोई चीज न दें । चिकित्सक को बुलाए । जब तक चिकित्सक द्वारा कहा न जाए तब तक अल्टी न कराये । २. यदि सांस के साथ ग्रहण कर लिया है: मरीज को ताजी हवा में ले जाए और शरीर के तापमान की देखभाल करें । यदि मरीज सांस नही ले पा रहा है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो नियम श्वसन दें, तरजीही सीर पर मूँह से मूँह को सांस दे । चिकित्सक से परामर्श करें । ३. त्वचा से संपर्क होने पर : बालो नाखूनो के नीचे के भाग सहित शीर के प्रभावित अंगो को साबुन और खूब सारे पानी के साथ अच्छी तरह से धोए । यदि दर्द, जलन या लालिमा बनी रहती है तो चिकित्सक से संपर्क करें । सभी दूषित कपडों को अलग करें और इस्तेमाल से पहले साबुन एवं पानी के साथ अलग से अच्छी तरह धोए । ४. आँखो संपर्क होने पर: कम से कम १५ मिनट तक खूब सारे पानी के साथ कोमलतापूर्वक आँखो धोएं । यदि दर्द, जलन लालिमा या प्रकाशभीति बनी रहती है तो आंखों के विशेषज्ञ से संपर्क करें ।

पौधविशाक्तता : ——

विषनाशक : कोई भी ज्ञात विषनाशक नही है । लक्षणानुसार इलाज करें ।

खाली डिब्बो का निपटारा : १.खाली डिब्बो दुबारा इस्तेमाल नही किए जाने चाहिए । इन्हें ३ बार पानी से खंगाला जाना चाहिए और इस खंगाले गए पानी को छिड़काव के घोल में डाल देना चाहिए । २. खाली डिब्बो को तोडकर निवास से दूर जमीन में गाड दें । ३. खाली डिब्बो अतिरिक्त बची हुई सामग्री तथा मशीन के धोवन के पानी को इस तरह सुरक्षित ढंग से निपटो कि पर्यावरण व पानी प्रदूषित न हो ।

संग्रहण की शर्ते : १. कीटनाशक के डिब्बो को अन्य सामानों से अलग कमरें में बच्चों व पशुओं की पहुंच से दूर, पशुओ के चारों से दूर अलग अलमारी में ताला- चाबी लगाकर रखना चाहिए । २. कीटनाशक का भण्डारण का कमरा मजबूती से बना, सूखा प्रकाशवाला, हवादार तथा लंबा-चौडा हो जिससे इसकी वाष्प से पर्यावरण प्रदूषण न हो ।

रसायनिक संरचना :

सायनट्रेनीलिप्रोल स.त.	१०.२६% भार/भार
डोडीसेल बेंज़िन सल्फोनेट इन मिथेलेटेड तथा इथॉक्सिलेटेड सीड ऑइल	२५.००% भार/भार
पॉलिऑक्सिइथालिन सॉरबिटॉल फैटी एसिड	५.००% भार/भार
फ्युम्ड सिलिका	१.३१% भार/भार
सायट्रिक एसिड	०.०२% भार/भार
पानी	४.११% भार/भार
मिथिलेटेड सीड ऑइल	% पर्याप्त मात्रा
	कुल : १००% भार/भार

चेतावनी: इस लेबल/इस पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें ।

BENEFIT-OD

Cyantraniliprole 10.26% w/w OD
(Systemic and Contact Insecticide)

సైంట్రానిలిప్రోల్ 10.26% w/w ఓడ్
(దైహిక మరియు సంపర్క పురుగుమందు)

ಸೈಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 10.26% w/w od
(ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕ

सायनट्रैनीलिप्रोल १०.२६% भा/भा ओ.डी.
(अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

சயண்ட்ரானிலிப்ரோல் 10.26% w/w OD
(முறையான மற்றும் தொடர்பு பூச்சிக்கொல்

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

जहर
ವಿಷಂ
విష విషము
POISON

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।
ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ
பயன்பாட்டிற்கு முன் முழு லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரத்தையும் படிக்கவும்

Manufactured & Marketed by :

Maa Agri Sciences Private Limited

Survey No. 734, Mandollagudem Village, Chinnakondur,
Choutuppal Mandal, Bhuvanagiri Dist. - 508252, T.S. India
Customer Care No. : 08694293575, E-mail : maaagri2020@gmail.com

Regd. No. : CIR326426/2023 Cyantraniliprole (OD) (447)-219
Mfg. Lic No. 117/TS-IML/2023

ಸಯಣ್ಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 10.26% w/w OD

(ಮೃದಾಯಾನ ಮತ್ತು ಹೊರ್ಟ್ರ ಪ್ಯೂಶಿಕ್ಕೊಲ್ಲಲಿ)

ಸಯಣ್ಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 10.26% w/w OD ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಹೊಸ ಆಂಥ್ರಾನಿಲಿಕ್ ಡೈಮೈಡ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಇದು ಅಗಿಯುವ ಮತ್ತು ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಇದು ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೇನುನೊಣಗಳ ಮೇವು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಹೊರ್ಟ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.

Recommendation :

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಕೀಟದ	ಡೋಸೇಜ್/ಎಎಫ್ ಎ		ಮಲೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಗರಿಷ್ಠ (ರಾಯಲ್)	ಸಂಯುಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಕೀಟದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಕೀಟದ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆ) —
		ಎಂ	ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಲೂಸ್			
ಕಪಿ	ಥೈಪ್ಸ್-ಥೈಪ್ಸ್ ಟಾಬಾಸಿ	90	900	500	5	
ಸೂಂಬಾಯಿ	ಬಳಿ ಥೈಪ್ಸ್ಪಲ್ಮಾಯಿ					
	ತಪ್ಪಾದ ಗಿಡಹೇನುಗಳು—ಅಫಿಡ್					
	ರಫಿಡುಲಾ ಕಂಬಾಳಕಾಯ					
	ಕ್ಯಾಂಪೋಫ್ಲೆಗೋಯಾಫಾಸಿಯಾ					
	ಕ್ಯಾಪಿಟಾಟಾ ಎಲೆ ಮಿಟೆಗಳಿಂದ					
	ಟಪ್ಪಿಯಾಡ್ ಗಡಿಹುಳು					
ಬದನೆಕಾಯಿ	ಥೈಪ್ಸ್-ಥೈಪ್ಸ್ಟಾಬಾಸಿ	90	900	500	3	–
	ತಪ್ಪಾದ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು					
	ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವವರು—ಬ್ಯಾಸಿಲೋಕ್ಸಿಲ್					
	ಡಾರ್ಸಾಲಿಸ್ ಗಿಡಹೇನುಗಳು—ಅಫಿಡ್					
	ರಫಿಡುಲಾ ಥೈಪ್ಸ್-ಥೈಪ್ಸ್ ತಪ್ಪಾದ					
ಎಲೆಕೋಸು	ಎಲೆಕೊರೆಯ ಆಫಿಡ್ –	60	600	500	5	–
	ಪ್ರೂಸೆಲಾದ ಪ್ಲುಟೆಲ್ಲಾ					
	ಸಾಸಿವೆ ಗಿಡಹೇನು – ಲಿಪಾಫಿಸ್					
	ಎರಿಸಿಮಿ ಬೈಪಾಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿಟ್ಟೆ –					
	ಪ್ಲುಸಿಯಾ ಥೈಪ್ಸ್ಸಿಗ್ನಾ ತಪ್ಪಾದ					
	ಕೇಪರ್ಬುಶ್ – ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟುರಾ					
ಚಿಲ್ಲಿ	ಥೈಪ್ಸ್-ಸ್ಟಿರೋಗ್ಲಾಸ್	60	600	500	3	
	ಡೆಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವವರು ಹುಳು—					
	ಹೆಲಿಕೋವೆರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ					
	ತಪ್ಪಾದ ಹಣ್ಣುಹುಳು –					
	ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟುರಾ					
ಕಾಟನ್	ಥೈಪ್ಸ್-ಥೈಪ್ಸ್ಟಾಬಾಸಿ	90	900	500	7	–
	ತಪ್ಪಾದ ಅಫಿಡ್ಸ್					
	ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಕಡಲೆ ಕಾಯಿ					
	ತಪ್ಪಾದ ತಪ್ಪಾದ ಕ್ಯಾಪಿಟಾಟ್ಸ್ಪಾಡೋಪ್ಟೆರಾ					
	ಲಿಟುರಾ ಮೊಲ್ಲಿಪ್ಲೂಸಿಯೋಸಾಪ್ಸ್					
	ಆಪಾಸೀರಾ					
ಗೆರ್ಕಿನ್	ಲೀಫ್ ಮೈನರ್ –	90	900	500	5	
	ಲಿರಿಯೊಮಿಜಾ ಟ್ರಿಫೋಲಿ					
	ಕೆಂಪು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜೀರುಂಡೆ –					
	ಕೆಸಾಂಕೋಫೊರಾ ಫೂಸಿಕೋಲಾರಾ ಗಿಡಹೇನುಗಳು –					
	ಡಿಕಿಯಾ ರಫಿಡುಲಾ ಥೈಪ್ಸ್-ಥೈಪ್ಸ್					
	ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮೈ ಮಾರಾಯಾಗಾ – ಡೆಸ್ಮೊಸಿಯಾ ತಪ್ಪಾದ					
	ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಾಟ್ಸ್ – ಡಿಯಾಫಾನಿಯಾ					
	ಇಂಡಿಕಾ ಪೆಪೋನ್ – ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರೋಸೆರಾ					
	ಕುಕುರ್ಬಿಟೆ					
ಬಾಷ್ಪಿ	ಥೈಪ್ಸ್-ಸ್ಟಿರೋಗ್ಲಾಸ್	70	700	1000	5	
	ಡೆಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವವರು –					
	ಸ್ಪೈಡರ್ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹುಳುಗಳು					
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ	ಥೈಪ್ಸ್-ಥೈಪ್ಸ್ಟಾಬಾಸಿ	90	900	500	3	–
	ತಪ್ಪಾದ ಆಫಿಡ್ ಆಫ್ ಗೋಸಿ					
	ಪೈ ಟಾಬಾಸಿ					
ಪೇಯಾರ್	ಥ್ರಿಪ್ಸ್-ಸ್ಟಿರೋಗ್ಲಾಸ್	75(0.0075%)	750(0.075%)	1000	5	
	ಗ್ರಾಪ್ಟೋಲಿಥ್ ಡಾಸಾಲಿಯಾ ಬಾಳಾಂಚೆ ಚಿಟ್ಟೆ					
	– ಡೆಲ್ಟೊಟೋಲಾ ಬಿಸಿಗಿಕೆಸ್					
	ಪ್ಲೆಸ್ಟಾಲ್ಸ್-ಪ್ಲೆಸ್ಟಾಲ್ಸ್	90(0.009%)	900(0.09%)	1000	5	
	ಟ್ರಿಪಿಲಿಯಾ ಗಿಡಹೇನುಗಳು– ಅಫಿಡ್ ಪ್ಲಾಸೀ					
ಪೊಮ್	ಥ್ರಿಪ್ಸ್-ಥ್ರಿಪ್ಸ್	90	900	500	5	–
	ಸೂಪರ್ಕಲಿಸ್ ಬಳಿ ಸೂರ್ಯ – ಪೆಪಿಯಾಯಾ ತಪ್ಪಾದ					
	ಗಿಡಹೇನುಗಳು–ಅಫಿಡ್ ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ					
	ಕ್ಯಾಪಿಟಾಟ್ಸ್ಪಾಡೋಪ್ಟೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಎಲೆ					
	ಮೈನರ್ಲಿಯೊಮಿಜೆಸ್ ಟ್ರಿಫೋಲಿ					
ಥ್ರಿಪ್ಸ್-ಥ್ರಿಪ್ಸ್	ಥ್ರಿಪ್ಸ್-ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಟಾಬಾಸಿ	90	900	500	5	–
	ಬಳಿ ಸೂರ್ಯ – ಪೆಪಿಯಾಯಾ ತಪ್ಪಾದ					
	ಗಿಡಹೇನುಗಳು–ಅಫಿಡ್ ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ					
	ಕ್ಯಾಪಿಟಾಟ್ಸ್ಪಾಡೋಪ್ಟೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಎಲೆ					
	ಮೈನರ್ಲಿಯೊಮಿಜೆಸ್ ಟ್ರಿಫೋಲಿ					
ಟೊಮೆಟೊ	ಎಲೆ ಗಣಿಗಾರ–	90	900	500	5	–
	ಲಿರಿಯೊಮಿಜಾ					
	ಆಲಿಯೊಡಿಯಾ ಗಿಡಹೇನುಗಳು – ಅಫಿಡ್					
	ರಫಿಡುಲಾ ಥ್ರಿಪ್ಸ್					
	ತಪ್ಪಾದ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಟಾಬಾಸಿ – ಪೆಪಿಯಾಯಾ					
	ತಪ್ಪಾದ ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವವರು					
	ಹೆಲಿಕೋವೆರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ					
ವಾಟರ್	ಥ್ರಿಪ್ಸ್-ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಟಾಬಾಸಿ	90	900	500	5	–
	ಕ್ಲಾಂಗಿಗ ಬಳಿ ಥ್ರಿಪ್ಪಾಯಿಯಾ					
	ತಪ್ಪಾದ ಗಿಡಹೇನುಗಳು–ಅಫಿಡ್					
	ಗಾಸಿಪ್ ಎಲೆ ಗಣಿಗಾರ–					
	ಲಿರಿಯೊಮಿಜಾ ಟ್ರಿಫೋಲಿ					

ಬಳಕೆಯ ದಿಕ್ಕು–

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ:

ಮಾನವಿಕ್ಷಯಕಗಳು : 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಲಾ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜಿನ ಇಳ್ಳಲೇಷನ್. 3. ಉದ್ದ ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿರೋಧಕ ಕೈಗವಸುಗಳ ಜೊಗಳ ಸ್ಯಾಕ್ಷಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. 4. ಉತ್ಪನ್ನವು ಮಧ್ಯಮ ಕಣ್ಣಿನ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಣ್ಣಿನ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. 5. ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 6. ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಪಿಷ್ಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಮಧ್ಯಮ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಸಂಪರ್ಕವು ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ಷಗಳಿಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಸೇವಿಸಿದರೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಜರಾದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಬಯಸಿದಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ತನಕ ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ: ಕೋಣೆಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಣೆಯ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿದ್ದರೆ ಶ್ವಾಸ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ. ಮೇಲಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿ. ಸಿ-ಪೈವ್ಡ್ರನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 3. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಸೋಪು, ಶಿಂಪು ಅಥವಾ ಶಿರಳಿಕೆ ಮಾಂಸಾವರದರೆ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ದೇಹದ ಪೀಡಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 4. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸೋಪು, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಊತಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪೈಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್: .

ಪ್ರತಿವಿಷ: ರಕ್ತಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಸುರಿಯಬೇಕು. 2. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಂಸಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕು. 3. ಬಳಸದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಗಳ ಮೂರು–ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೊರಗೆ ಬಡಬಾರದು. 4. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೂರ್ವಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳ ಆಹಾರ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳ ಅಲ್ಲದಾದವುಗಳಿಲ್ಲ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ, ಹಿತ್ತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳು ಆಸ್ಪರಿಂದ ಅವಿಗಳಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು:

ಸೈಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಎ.ಐ.	10.26 % ತಿ/ತಿ
ನೆಲ್ಲಿ ಡೋಡೆಸಿಲ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	25.00 % ತಿ/ತಿ
ಮೀಥೈಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ	
ಹಾಲಿಯೊಕ್ಸಿಥ್ರಿಲೀನ್ ಸೋರ್ಬಿಟೋಲ್ ಕೊಬ್ಬಾಸಾಮ್	5.00 % ತಿ/ತಿ
ಫ್ಯೂಮಸ್ ಸಿಲಿಕಾ	1.31 % ತಿ/ತಿ
ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ	0.02 % ತಿ/ತಿ
ನೀರು	4.11 % ತಿ/ತಿ
ಮೀಥೈಲೇಟೆಡ್ ಬೀಜದ	ಎಣ್ಣೆ % ತಿ.ಪ
ಒಟ್ಟು:	100 % ತಿ/ತಿ

ಸೈಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 10.26% w/w od

(ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕ)

Cyantraniliprole 10.26% w/w OD is a novel anthranilic diamide insecticide effective against a cross spectrum of chewing and sucking pests. It is a systemic insecticide which is effective through ingestion and contact Warning: This product is toxic to aquatic organisms and honeybees thus may be avoided near aquaculture and active period of foraging of honey bees.

Recommendation :

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಕೀಟದ	ಡೋಸೇಜ್/ಎಎಫ್ ಎ		ಮಲೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಗರಿಷ್ಠ (ರಾಯಲ್)	ಸಂಯುಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಕೀಟದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಕೀಟದ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆ) —
		ಎಂ	ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಲೂಸ್			
ಕಪಿ	ಥೈಪ್ಸ್-ಥೈಪ್ಸ್ ಟಾಬಾಸಿ	90	900	500	5	
ಸೂಂಬಾಯಿ	ಬಳಿ ಥೈಪ್ಸ್ಪಲ್ಮಾಯಿ					
	ತಪ್ಪಾದ ಗಿಡಹೇನುಗಳು—ಅಫಿಡ್					
	ರಫಿಡುಲಾ ಕಂಬಾಳಕಾಯ					
	ಕ್ಯಾಂಪೋಫ್ಲೆಗೋಯಾಫಾಸಿಯಾ					
	ಕ್ಯಾಪಿಟಾಟ ಎಲೆ ಮಿಟೆಗಳಿಂದ					
	ಟಪ್ಪಿಯಾಡ್ ಗಡಿಹುಳು					
ಬದನೆಕಾಯಿ	ಥೈಪ್ಸ್-ಥೈಪ್ಸ್ಟಾಬಾಸಿ	90	900	500	3	–
	ತಪ್ಪಾದ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು					
	ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವವರು—ಬ್ಯಾಸಿಲೋಕ್ಸಿಲ್					
	ಡಾರ್ಸಾಲಿಸ್ ಗಿಡಹೇನುಗಳು—ಅಫಿಡ್					
	ರಫಿಡುಲಾ ಥೈಪ್ಸ್-ಥೈಪ್ಸ್ ತಪ್ಪಾದ					
ಎಲೆಕೋಸು	ಎಲೆಕೊರೆಯ ಆಫಿಡ್ –	60	600	500	5	–
	ಪ್ರೂಸೆಲಾದ ಪ್ಲುಟೆಲ್ಲಾ					
	ಸಾಸಿವೆ ಗಿಡಹೇನು – ಲಿಪಾಫಿಸ್					
	ಎರಿಸಿಮಿ ಬೈಪಾಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿಟ್ಟೆ –					
	ಪ್ಲುಸಿಯಾ ಥೈಪ್ಸ್ಸಿಗ್ನಾ ತಪ್ಪಾದ					
	ಕೇಪರ್ಬುಶ್ – ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟುರಾ					
ಚಿಲ್ಲಿ	ಥೈಪ್ಸ್-ಸ್ಟಿರೋಗ್ಲಾಸ್	60	600	500	3	
	ಡೆಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವವರ ಹುಳು—					
	ಹೆಲಿಕೋವೆರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ					
	ತಪ್ಪಾದ ಹಣ್ಣುಹುಳು –					
	ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟುರಾ					
ಕಾಟನ್	ಥೈಪ್ಸ್-ಥೈಪ್ಸ್ಟಾಬಾಸಿ	90	900	500	7	–
	ತಪ್ಪಾದ ಅಫಿಡ್ಸ್					
	ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಕಡಲೆ ಕಾಯಿ					
	ತಪ್ಪಾದ ತಪ್ಪಾದ ಕ್ಯಾಪಿಟಾಟ್ಸ್ಪಾಡೋಪ್ಟೆರಾ					
	ಲಿಟುರಾ ಮೊಲ್ಲಿಪ್ಲೂಸಿಯೋಸಾಪ್ಸ್					
	ಆಪಾಸೀರಾ					
ಗೆರ್ಕಿನ್	ಲೀಫ್ ಮೈನರ್ –	90	900	500	5	
	ಲಿರಿಯೊಮಿಜಾ ಟ್ರಿಫೋಲಿ					
	ಕೆಂಪು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜೀರುಂಡೆ –					
	ಕೆಸಾಂಕೋಫೊರಾ ಫೂಸಿಕೋಲಾರಾ ಗಿಡಹೇನುಗಳು –					
	ಡಿಕಿಯಾ ರಫಿಡುಲಾ ಥ್ರಿಪ್ಸ್-ಥ್ರಿಪ್ಸ್					
	ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮೈ ಮಾರಾಯಾಗಾ – ಡೆಸ್ಮೊಸಿಯಾ ತಪ್ಪಾದ					
	ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಾಟ್ಸ್ – ಡಿಯಾಫಾನಿಯಾ					
	ಇಂಡಿಕಾ ಪೆಪೋನ್ – ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರೋಸೆರಾ					
	ಕುಕುರ್ಬಿಟೆ					
ಬಾಷ್ಪಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್-ಸ್ಟಿರೋಗ್ಲಾಸ್	70	700	1000	5	
	ಡೆಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವವರ –					
	ಸ್ಪೈಡರ್ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹುಳುಗಳು					
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ	ಥೈಪ್ಸ್-ಥೈಪ್ಸ್ಟಾಬಾಸಿ	90	900	500	3	–
	ತಪ್ಪಾದ ಆಫಿಡ್ ಆಫ್ ಗೋಸಿ					
	ಪೈ ಟಾಬಾಸಿ					
ಪೇಯಾರ್	ಥ್ರಿಪ್ಸ್-ಸ್ಟಿರೋಗ್ಲಾಸ್	75(0.0075%)	750(0.075%)	1000	5	
	ಗ್ರಾಪ್ಟೋಲಿಥ್ ಡಾಸಾಲಿಯಾ ಬಾಳಾಂಚೆ ಚಿಟ್ಟೆ					
	– ಡೆಲ್ಟೊಟೋಲಾ ಬಿಸಿಗಿಕೆಸ್					
	ಪ್ಲೆಸ್ಟಾಲ್ಸ್-ಪ್ಲೆಸ್ಟಾಲ್ಸ್	90(0.009%)	900(0.09%)	1000	5	
	ಟ್ರಿಪಿಲಿಯಾ ಗಿಡಹೇನುಗಳು– ಅಫಿಡ್ ಪ್ಲಾಸೀ					
ಪೊಮ್	ಥ್ರಿಪ್ಸ್-ಥ್ರಿಪ್ಸ್	90	900	500	5	–
	ಸೂಪರ್ಕಲಿಸ್ ಬಳಿ ಸೂರ್ಯ – ಪೆಪಿಯಾಯಾ ತಪ್ಪಾದ					
	ಗಿಡಹೇನುಗಳು–ಅಫಿಡ್ ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ					
	ಕ್ಯಾಪಿಟಾಟ್ಸ್ಪಾಡೋಪ್ಟೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಎಲೆ					
	ಮೈನರ್ಲಿಯೊಮಿಜೆಸ್ ಟ್ರಿಫೋಲಿ					
ಥ್ರಿಪ್ಸ್-ಥ್ರಿಪ್ಸ್	ಥ್ರಿಪ್ಸ್-ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಟಾಬಾಸಿ	90	900	500	5	–
	ಬಳಿ ಸೂರ್ಯ – ಪೆಪಿಯಾಯಾ ತಪ್ಪಾದ					
	ಗಿಡಹೇನುಗಳು–ಅಫಿಡ್ ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ					
	ಕ್ಯಾಪಿಟಾಟ್ಸ್ಪಾಡೋಪ್ಟೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಎಲೆ					
	ಮೈನರ್ಲಿಯೊಮಿಜೆಸ್ ಟ್ರಿಫೋಲಿ					
ಟೊಮೆಟೊ	ಎಲೆ ಗಣಿಗಾರ–	90	900	500	5	–
	ಲಿರಿಯೊಮಿಜಾ					
	ಆಲಿಯೊಡಿಯಾ ಗಿಡಹೇನುಗಳು – ಅಫಿಡ್					
	ರಫಿಡುಲಾ ಥ್ರಿಪ್ಸ್					
	ತಪ್ಪಾದ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಟಾಬಾಸಿ – ಪೆಪಿಯಾಯಾ					
	ತಪ್ಪಾದ ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವವರು					
	ಹೆಲಿಕೋವೆರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ					
ವಾಟರ್	ಥ್ರಿಪ್ಸ್-ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಟಾಬಾಸಿ	90	900	500	5	–
	ಕ್ಲಾಂಗಿಗ ಬಳಿ ಥ್ರಿಪ್ಪಾಯಿಯಾ					
	ತಪ್ಪಾದ ಗಿಡಹೇನುಗಳು–ಅಫಿಡ್					
	ಗಾಸಿಪ್ ಎಲೆ ಗಣಿಗಾರ–					
	ಲಿರಿಯೊಮಿಜಾ ಟ್ರಿಫೋಲಿ					

ಬಳಕೆಯ ದಿಕ್ಕು–

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ:

ಮಾನವಿಕ್ಷಯಕಗಳು : 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದ