

Triflumezopyrim 10% w/w SC (Systemic and Contact Insecticide)

Triflumezopyrim 10% w/w SC (10.6% w/v) is amesoinic insecticide effective against Plant hoppers of Rice. CAUTION: • The product is toxic to honey bees and thus the use should be avoided during active foraging period of the bees. • Do not spray on crops other than those specified on this leaflet. • The product is toxic to aquatic organisms and hence should be avoided in or around aquaculture.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	AI (gm)	Dosage/Ha Formulation (ml)	Dilution in Water (litre)	Waiting Period between each last spray	Re-entry after harvest - day (In Hours)
Paddy	Brown Plant Hopper (Nilaparvata lugens), White Backed Plant Hopper (Sogatella furcifera)	25	236	500	21	-

Direction Of Use : Method and time of application: The product is to be foliar applied when pest populations reachETL (Economic Threshold Level). Curative applications are not advised. Do not make more than one application per crop season. Do not apply when weather conditions favor drift from treated areas. Spray equipment: Use high volume spraying equipment, such as knapsack sprayer/atomizer with hollow cone nozzle ensuring thorough and uniform coverage. Instructions for mixing: Fill spray tank $\frac{1}{4}$ to $\frac{1}{2}$ full of water. Add the insecticide directly to the spray tank and mix thoroughly, to fully disperse the insecticide. Continue agitation using mechanical or hydraulic means. Do not store spray mix solutions for more than three hours. Re-entry period: Do not enter treated areas until spray deposit have dried.

Time of Application :-

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid inhalation of the insecticide spray mist and contact with mouth, eyes, and skin. 3. Use protective clothing such as long sleeved shirt and long pants, gloves, shoes plus socks. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and body parts after handling. 5. Do not eat, drink or smoke while applying.

Symptoms Of Poisoning : May cause dehydration, spasm, slow breathing, apathy and lethargy.

First Aid : 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Phytotoxicity :

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Disposal Of Used Container :** 1. Dangerous to reuse empty containers for domestic use i.e. storage of water & food items. 2. Used packages shall not be left outside to prevent their reuse and shall be broken and buried away from habitation. 3. Triple rinse containers with water and pour rinsate to the spray mix. 4. Packages or surplus material and washings shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, away from the reach of children and livestock, animal feed or shall be kept in a separate almirah under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, cool dry place, well-lit, ventilated and of sufficient dimensions so as to avoid contamination with vapors.

Chemical Composition :

Triflumezopyrim a.i	10.0 % w/w
Methyl methacrylate ethoxylated graft copolymer	3.0 % w/w
Mixture of ethyleneoxide/propyleneoxide block copolymer and ethoxylated alcohol	2.0 % w/w
Hydrocarbons, organopolysiloxanes modified	0.5 % w/w
Mixture of 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one	0.1 % w/w
Hydrated magnesium aluminiumsilicate	2.0 % w/w
Xanthan gum	0.25 % w/w
Propane-1,2-diol	6.8 % w/w
Water	Q.S. %
Total :	100 % w/w

ट्राइफ्लुमेजोपाइरिम १० % भा/भा एस.सी.

(अंतिप्रवाही एवं स्वर्णीय कीटनाशक)

ट्राइफ्लुमेजोपाइरिम १० % भा / भा एस.सी. (१०.३ % डब्ल्यू.पी.) एक मिसोआमिनिक कीटनाशक है जो धान के फुटकों के प्रति असरदार है। सावधानी: १. यह उत्पादन मधुमक्खियों के लिए इसका प्रयोग मधुमक्खियों के सक्रिय होने पर न करें। २. इस लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल में इसे इस्तेमाल न करें। ३. यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए विषेश है और इसलिए इसका मत्स्यपालन गतिविधियों में या उसका आसापास न करें।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेएर मात्रा	पानी की अन्तिम छिकाव	पुणः प्रेषण की स. तथा बीमांचना मात्रा	तथा फसल काढने अन्तिम प्रयोग (ग्राम)	पुणः प्रेषण की सीधे अन्तराल छिकाव के विषय का वर्ग (घंटे)
धान	भूरा फुदवा (नीलांचलवाला तुदाग्या), सफेद घी वाला फुदवा (सोनांचलवाला फुदविकेपा)	२५	२३.६	५००	२१	-

उपयोग के लिए दिशा - निर्देश : प्रयोग का समय व तरीका: इस उत्पाद को कीट का हमला शुरू होने पर कीट की रंखावा बढ़ने से बहले प्रतियों पर छिकाव किया जाना चाहिए। १. उत्पादन की साथ इस्तेमाल की साथ नहीं दी जानी। २. एक फसल सीजन में उत्पाद को एक बार से अधिक इस्तेमाल न करें। ३. जब मोसास की परिचयतियां उपचारित क्षेत्रों में बहाव के अनुकूल हों तब छिकाव न करें। छिकाव उपचार: पूरी तरह से और एकसमान छिकाव सुनिश्चित करें जो लिए हाई वॉल्यूम वाला स्प्रे उपचारण इस्तेमाल करें, जैसे लैपसेक स्प्रेयर, जिसमें होलों को नोजल लगा द्वारा होना चाहिए। ४. मिश्रण के लिए निर्देश: रेट २/४ से १/२ तक पानी से मरें। ५. कीटनाशक को सीधे से टैक में लाले और अच्छी तरह मिलायें, ताकि कीटनाशक को पूरी तरह से मिल जाए। ६. मैकेनिकल या हाईड्रोलिक का इस्तेमाल करता हुए लगातार छिलाते रहें। ७. मिश्रण के घोल की तीन घंटे से अधिक संधर्घ न करें। पुणः प्रेषण की अवधि: छिकाव की गांठ सुख जाने पर तक, उपचारित क्षेत्र में प्रवेश न करें।

प्रयोग का समय :-

प्रयोगकर्ताओं के लिए साकारात्मकीय : १. खाद्यानामी, खच्च सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. कीटनाशक के छिकाव को बुलाएं। ३. जब तक विकास तारा कहा न जाए, तब तक उल्टी करताने की कोशिश न करें। ४. यदि सांस के साथ ग्रहण तक लिया हो: मरीज को ताजी हवा में ले जाएं और शरीर के तापांतर की ठेकावाल करें या चेहरोंने सांस नहीं ले रहा है या सांस लेने में कठिन है तो रक्ती जली या चार्ट्रिज अवधि दें। ५. प्रयोग के बाद दूधिक प्रक्रिया और शरीर के अंगों को अच्छी तरह से धोएं। ६. प्रयोग के समय खाना, पीना या धुम्रपाण नहीं करें। ७. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक संधर्घ करें। ८. अच्छी से संधर्घ होने पर: कान से कर १-५ मिनट तक खबर लाना पानी के साथ कॉम्पल्टायर्प्रूफ अंगीकों को धोएं। ९. यदि दर्द, जलन, लालिमा या प्रक्रान्तिभीति वारी रहती है तो अच्छी के विशेष जंपर्स करें।

पोषणीय क्षिकित्सा :

प्रियंका के लिए विकित्सा : १. यदि निगल लिया गया हो: यदि मरीज होश में और सचेत है तो मैंटैट को पानी के साथ कुल्ला करवाएं और पीने के लिए १ या २ मिलास पानी दें। कभी भी भी बीमांचनी के बीचों वाले दूर रखें। २. कीटनाशक के छिकाव को बुलाएं। ३. जब तक विकास तारा कहा न जाए, तब तक उल्टी करताने की कोशिश न करें। ४. यदि सांस के साथ ग्रहण तक लिया हो: मरीज को ताजी हवा में ले जाएं और शरीर के तापांतर की ठेकावाल करें या चेहरोंनी लोंगों पर चूंके दें। ५. प्रयोग के बाद दूधिक प्रक्रिया दें। ६. त्वचा से संधर्घ करें। ७. त्वचा से धोएं। ८. यदि विकास तक सांस नहीं ले रही है तो चेहरोंनी लोंगों पर चूंके दें। ९. खानी डिक्कों को लोडकर लेने में जारी रहती है तो विकास तक संधर्घ करें। १०. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ११. सांस देने वाली जली या चार्ट्रिज अवधि दें। १२. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। १३. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। १४. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। १५. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। १६. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। १७. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। १८. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। १९. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। २०. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। २१. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। २२. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। २३. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। २४. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। २५. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। २६. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। २७. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। २८. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। २९. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ३०. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ३१. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ३२. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ३३. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ३४. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ३५. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ३६. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ३७. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ३८. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ३९. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ४०. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ४१. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ४२. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ४३. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ४४. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ४५. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ४६. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ४७. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ४८. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ४९. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ५०. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ५१. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ५२. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ५३. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ५४. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ५५. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ५६. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ५७. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ५८. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ५९. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ६०. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ६१. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ६२. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ६३. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ६४. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ६५. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ६६. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ६७. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ६८. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ६९. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ७०. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ७१. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ७२. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ७३. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ७४. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ७५. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ७६. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ७७. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ७८. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ७९. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ८०. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ८१. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ८२. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ८३. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ८४. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ८५. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ८६. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ८७. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ८८. यदि दर्द, जलन या लालिमा वारी रहती है तो विकास तक से संधर्घ करें। ८९. यदि दर

